

営農技術情報

一畑作（秋まき小麦④）一

令和2年 6月10日発行

上川農業改良普及センター名寄支所 Tel.01654-2-4524

JA道北なよろ Tel.01655-3-2521

JA道北なよろ営農センターTel.01654-3-4307

～赤かび病防除のタイミングを逃さないこと！～

1 生育経過

止葉期は平年より5日早く、すでに出穂が進んでいます。

平年より草丈は長く、茎数は多く推移しています。

＜生育状況(6月1日現在)＞

| | 止葉期 | 出穂始 | 出穂期 | 出穂揃 | 草丈 (cm) | 茎数 (本/m ²) |
|-----------|-------------|---------------|------|------|------------|---------------------------|
| 本年 | 5/28 | (6/ 3) | | | 62 | 1,607 |
| 平年 | 6/ 2 | 6/ 7 | 6/ 9 | 6/11 | 53 | 1,349 |
| 遅速 | 早5日 | — | | | +9 | +258 |

※()内の数値は、6月1日現在での見込み。

2 赤かび病防除 ～開花始とその7日後の2回を徹底！～

- ・最も感染しやすい時期は、開花するときです。
- ・防除は、感染前の穂に薬剤を十分付着させることが重要です。
- ・開花は、出穂揃の4～5日後に始まりますが、好天が続くと早まります。
- ・防除適期に降雨が予想される場合は、降雨前に防除を行いましょう。

【防除体系例】（令和2年度JA農作物施肥・病虫害・雑草防除ガイドより）

| 散布時期 | | 薬剤名 | 使用倍率 | 使用時期 | 使用回数 |
|------|------|---------------------|------------|--------|---------|
| 1回目 | 開花始 | シルバキュアフロアブル | 2000倍 | 収穫7日前 | 2回 |
| | | または リベロ水和剤 | 2000倍 | 収穫7日前 | 3回 |
| 2回目 | 1週間後 | トップジンM水和剤 | 1000～1500倍 | 収穫14日前 | 出穂期以降2回 |
| | | または ベフトップジンフロアブル | 800～1000倍 | 収穫14日前 | 出穂期以降1回 |
| 3回目 | 2週間後 | シルバキュアフロアブル | 2000倍 | 収穫7日前 | 2回 |
| | | または リベロ水和剤 | 2000倍 | 収穫7日前 | 3回 |

3 追肥について

- ・止葉期の追肥を行っていないほ場では、速やかに追肥を行いましょう（目安：窒素2～4kg/10a）。
- ・例年タンパクが低いほ場では、尿素の葉面散布を行いましょう（尿素1～1.5%溶液を2～3回、赤かび病防除と同時散布）。

◎ 農薬は使用基準を守り、農薬飛散に注意しましよう ◎