

## 雪腐病防除は「フロンサイドSC」で行いましょう！

### ○ 薬剤の選定：フロンサイドSC

名寄市において例年発生している雪腐病は、雪腐褐色小粒菌核病と紅色雪腐病、雪腐黒色小粒菌核病です。近年では、褐色雪腐病の発生が増加しています。

以下の薬剤を併せて使用することで、地域で発生している雪腐病を防除することができます。

防除薬剤例（令和2年度JA農作物施肥・病虫害・雑草防除ガイド、一部加筆）

対象病害	薬剤名	使用時期	使用量	散布水量	使用回数
紅色雪腐病 雪腐小粒菌核病 雪腐大粒菌核病 なまぐさ黒穂病	フロンサイドSC	根雪前	1,000倍	100～150L/10a	2
褐色雪腐病	ランマンフロアブル	根雪前	1,000倍	100L/10a	3

### ○ 防除のタイミング：10月中下旬～根雪前

雪腐病防除薬剤の効果は、散布から根雪までの積算降水量が一定量に達するまで影響を受けません。フロンサイドSCは積算降水量120mm、ランマンフロアブルは150mmに達するまで十分効果が維持されます。

近年の気象条件を考慮すると、散布時期は10月中下旬まで前倒しできる傾向です。

### ○ 使用の留意点

なまぐさ黒穂病発生の恐れがあるほ場では、雪腐病防除と併せて、特に「フロンサイドSC」を使用しましょう。

なお、フロンサイドSCは地上散布のみの登録で、無人ヘリ等では使用できません。

◎ 農薬使用の際は、必ずラベルを確認して正しく使用しましょう ◎