

# 営農技術情報

平成29年8月3日発行

— アスパラガス③ —

上川農業改良普及センター名寄支所 Tel.01654-2-4524

J A 道北なよろ Tel.01655-3-2521

## — アスパラガスの病害虫防除について —

- ・ 8月に入り、害虫の発生が多くなってきました。
- ・ 特に、ツマグロアオカスミカメの発生が目立っています。
- ・ 病害の防除と一緒に害虫防除を行いましょう。

### 1 害虫の防除

防除は、ツマグロアオカスミカメが中心となります。アザミウマ類も含めた防除を徹底しましょう。

#### 【防除薬剤例】

ヨトウ ガ類 登録	ジュウ シホシ 登録	アザミ ウマ類 登録	カメム シ類 登録	農薬名	使用倍率	使用基準	
						時期	回数
○	○		○	アディオン乳剤	2,000～3,000倍	収穫前日まで	3回
	○	○	○	ダントツ水溶剤	2,000～4,000倍	収穫前日まで	3回
	○	○		モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	収穫前日まで	2回
○		○		ディアナSC	2,500～5,000倍	収穫前日まで	2回

※ ジュウシホシ登録 → ジュウシホシクビナガハムシの登録

### 2 斑点病・茎枯病防除

茎枯病の発生が目立ってきています。地際部までかかるように水量を多めにして散布しましょう。また、斑点病の防除も徹底しましょう。

#### 【防除薬剤例】

茎枯病 登録	斑点病 登録	効果 発現	農薬名	使用倍率	使用基準	
					時期	回数
○	○	予治	アミスター20フロアブル	2,000倍	収穫前日まで	4回
○	○	予	ダコニールエース	1,500倍	収穫前日まで	4回
○	○	予	フロンサイドSC	2,000倍	収穫終了後秋季 まで(露地限定)	5回
○	○	予	ベルコート水和剤	1,000倍	収穫7日前まで	5回

※「アミスター20フロアブル」は浸透性を高める展着剤(アプローチBI・ニス・スツィ等)を混用すると薬害を生じる場合があるので加用しない。

### 3 トッピングと擬葉の整理

通路にはみ出している擬葉を整理し、トッピングを行って株の中にも薬液が十分にかかるようにしましょう。

薬剤使用の際は、「農作物病害虫防除ガイド」の注意事項をよく読んでください。