

営農技術情報

— 水稻 —

令和3年8月 6日発行

上川農業改良普及センター名寄支所 TEL01654-2-4524

JA道北なよろ

TEL01655-3-2521

アカヒゲホソミドリカスミカメが活発化しています！

7月後半から最高気温30℃を超える真夏日が続き、雨も少なく経過しています。アカヒゲホソミドリカスミカメは高温条件下で発生周期が短くなり、発生量が増加します（図1）。




図1 アカヒゲホソミドリカスミカメの発生活長（北海道病害虫防除所資料より）

名寄市でもアカヒゲホソミドリカスミカメが多発している地域が見られます（表1）。今後も高温が続く見込みのため、追加防除が必要と考えられます。

表1 フェロモントラップ捕獲頭数（7月28日設置 8月4日回収・調査 JA道北なよろ調べ）

風連地区	3区	豊里	東風連	アカシヤ	日進	西風連
捕獲頭数	8	5	5	11	15	10
名寄地区	中名寄・緑丘	旭東・日進 内淵	砺波	瑞穂	曙	共和・豊栄
捕獲頭数	1	0	1	0	0	2

出穂後10～12日にすくい取りを行い、2頭以上確認された場合、追加防除を行きましょう！

こまめに水分補給を行い、熱中症に注意しましょう！